Les causes de la DI

351-241-ME

La trisomie 21
(syndrome de Down)

- La **trisomie 21** constitue l'une des anomalies chromosomiques les plus fréquentes à la naissance. Au Québec, l'**incidence** est d'environ 1 cas pour 770 naissances vivantes dans la population générale.
- QI variant entre 40 et 45, donc le niveau de sévérité de la DI est de moyen à sévère. De façon exceptionnelle, la DI peut être légère et voir même absente.
- Les personnes ayant une trisomie 21 présentent également des déficits en termes **d'attention, de mémoire, de langage, de fonctions exécutives, de cognition spatiale**...

Syndrome du X fragile

- Déficience intellectuelle de légère à moyenne.
- Possibilité de mauvais contacts visuels et la présence d'anxiété sociale. Caractéristiques du TSA.
- Problèmes de mémoire, surtout de la difficulté avec la mémoire à long terme.
- Belle capacité verbale



Syndrome d’Angelman

- Absence du langage dans la majorité des cas
- Des excès de rire
- Des troubles de sommeil
- Une déficience intellectuelle sévère à profonde
- Des battements de mains

Syndrome Rubinstein Taybi

- Retard de développement de la communication non verbale et du langage.
- Les otites à répétition peuvent être à l'origine d'une surdité de transmission de sévérité variable.
- Les troubles du comportement plus fréquents chez ces enfants, en particulier une hyperactivité avec un déficit de l'attention, gênent les apprentissages scolaires.
- Des traits autistiques (perturbations de la relation sociale, recherches sensorielles, stéréotypies, etc.) sont parfois présents.

Syndrome de Cornelia de Lange

- Retard de croissance
- Déficience intellectuelle de sévérité variable
- Trouble du comportement de sévérité variable
- Déficit auditif
- Trouble ophtalmique
- Trouble du langage

Le syndrome de Prader-Willi

- Un QI variant de **normal** bas et une DI **moyenne**
- Difficultés d'apprentissage
- Dyspraxie verbale
- Troubles du comportement (troubles obsessionnels compulsifs)
- Grattage de peau
- Difficultés à contrôler les émotions

Syndrome Smith Magenis

- Di de moyenne à sévère
- Troubles du comportement qui se développe en général vers l’âge de 2 ans, car le syndrome vient souvent accompagné de d’autres troubles.
- Il y a les troubles d’attention, l’agitation et les crises violentes et prolongées.
- Commence à parler tardivement comparé aux autres enfants (3 ans).

Syndrome du Cris du Chat

- DI qui s’avère majoritairement de sévère à profonde
- Retard du langage souvent important
- Troubles de comportement (hyperactivité)
- Retard psychomoteur important